

LES ROSES par André Poliquin

1- Classification

Pour le jardinier amateur, les roses peuvent être classées en 3 grandes divisions: les **espèces**, les **rosiers anciens** et les rosiers **modernes** apparus depuis 1867. Dans cette dernière division, plusieurs groupes peuvent être identifiés : les **Hybrides Thé**, les **Floribunda**, les **Grandiflora**, (les trois sont regroupés en Europe dans les hybrides Thé), les **Grimpants**, les **Miniatures**, les **roses anglaises** et les **rosiers arbustifs modernes**.

2- La Plantation

Les rosiers ont besoin d'une bonne aération, et d'un minimum de 6 heures de soleil direct par jour. Ils peuvent aisément croître en sol lourd (argileux), et ont besoin de beaucoup d'eau, mais aussi d'un bon drainage. Le paillis est très important dans la prévention des maladies et des insectes ravageurs. Il faut pré-mouiller les racines d'une nouvelle plante (durant 12 heures) avant sa plantation dans un trou profond et large, avec poudre d'os et fumier décomposé.

3- La taille

Un nouveau rosier doit être sain; éliminer les tiges mortes, celles qui se croisent, celles qui sont trop faibles. Ne conserver que quelques bourgeons qui se dirigent vers l'extérieur du plant. Chez une plante établie, la taille se fait tard en automne et/ou tôt au printemps. Pour les rosiers anciens, les arbustes, les grimpants, les miniatures, il faut éliminer le 1/3 terminal des tiges. On donne alors la forme au plant, mais on élimine les tiges faibles ou malades, ainsi que la plus vieille tige du plant. Pour les autres hybrides modernes, la taille d'automne est sévère. Au printemps, on ne conservera que quelques bourgeons orientés vers l'extérieur du plant. Tailler au-dessus d'un bourgeon à vraie feuille (5-7 folioles) pour encourager les floraisons secondaires.

4- Insectes et maladies

Une bonne couche de paillis prévient des insectes et des maladies. L'arrosage ne devrait se faire que le matin. Éviter d'éclabousser le sol et l'eau sur le feuillage. Les insectes se combattent bien avec de l'eau savonneuse. Une bonne ventilation est nécessaire et une bonne culture préviendra des maladies. Une plante faible est facilement attaquée.

5- La protection hivernale

La majorité des rosiers nécessitent une telle protection en zones de rusticité de moins de 5. Les rosiers Agriculture Canada et plusieurs espèces font exception. La protection ne se fait qu'une fois le sol gelé. Taillez les rosiers, butter les pieds, et placez les protections. Les cônes à rosiers, les couvertures ou le paillis peuvent faire l'affaire. Les rosiers sur tiges doivent être déplantés et enterrés. Les rosiers grimpants peuvent être couchés sous les protections.

6- LES MEILLEURES ROSES

- | | | |
|------------------|-----|------------------------------|
| 1- Jeanne Lajoie | MIN | rose miniature grimpant rose |
| 2- Chicago Peace | HT | orange-rose, 1m |

3- Compassion	HT	grim pant, saumon né pâle .3m
4- Double delight	HT	parfum é, blanc et rouge, 1m
5- Foklore	HT	parfum é (Kordes) rose, 1,5m
6- Smoky	HT	parfum é, rouge délavé, 1m
7- Miss All American Beauty, FL		parfum é (Meilland), rose, 1m
8- Perfect Moment	HT	parfum é, saumon é-jaune-rose, 1m
9- Touch of Class	FL	rose, 1m
10- Arizona Sunset	Min	saumon é-jaune-rose, 20cm
11- Fall Festival	Min	splash jaune/rouge, 20cm
12- Mini Pearl	Min	rose pâle, 20cm
13- Rose Petticoat	Min	Rose foncé et blanc, 20cm
14- Helmut Schmith	HT	parfum é, jaune clair, 1m
15- Cristelle Van der Post	HT	jaune, 1m
16- Golden Celebration	Austin (GR)	parfum é, jaune, 1m
17- Graham Thomas	Austin (GR)	jaune pâle, 1,3m
18- Amberqueen	FL	parfum é, jaune pâle, 1m
19- Grace de Monaco	HT	parfum é (Meilland), 1m
20- Gertrude Jekyll	Austin (GR)	rose, 1,2m
21- Michèle Meilland,	HT	parfum é (Meilland), blanc-rose, 1m
22- Maid of Honour	HT	jaune-rose, 1m
23- Angel Face	FL	rose, 1m
24- Renaissance	FL	rose pâle/blanc, 1m
25- Shear Bliss	FL	rose, 1m
26- Ingrid Bergman	HT	rouge foncé, 1m
27- Baron Philippe de Roschild, HT		rouge, 1m
28- Électron	HT	rouge clair, 1m
29- Swartze Madona	HT	rouge foncé velours, 1m
30- Rose Peace	HT	parfum é (Meilland), rose foncé, 1m
31- Chicago Peace	HT	parfum é, rose/orange, 1m
32- Baronne de Roschild	OGR	Hybride Perpétuel, 2x floraisons, rose, 1,5m
33- Ave Maria	HT	orange-rose, 1m
34- Peace	HT	parfum é, (Meilland), rose-jaune pâle, 1,5m
35- John Cabot	Buisson	(Agr. Can) Grim pant, rose foncé, 5m
36- William Baffin	Buisson	(Agr. Can) Grim pant, rose foncé, 4m
37- Sympathie	HT	Grim pant, parfum é (Kordes), rouge, 4m
38- Dortmund	FL	Grim pant, (Kordes), rouge, 3m
39- Quadra	Buisson	(Agr. Can) Grim pant, foncé rose, 5m
40- Nicole	FL	blanche/rouge en bordure, 1m
41- Tabris	FL	blanche, rose foncé en bordure, 1m

42- Agriculture Canada

Louis Riel	fleur simple, blanche
Champlain	buisson, fleur double, rose foncé
John Cabot	grim pant buisson, rose foncé, fleur semi double
Frontenac	buisson, fleur semi double, rose foncé
Louis Jolliet	petit buisson, fleur double, rose foncé
Montarville	fleur simple, petit buisson, rouge
Simon Fraser	buisson, fleur double, rose/blanc
Winnipeg Park	buisson, fleur double, rouge
Marie-Victorin	petit buisson, fleur double, rose
Lambert Closse	petit buisson, fleur multi-double, rose
Morden Snow Beauty	petit buisson, fleur simple, blanche
Morden Fireglow	buisson, fleur double, rouge-rose
Morden Centennial	buisson, fleur multi-double, rose foncé
Morden Beauty	buisson, fleur multi-double, rouge pâle
Prairie Joy	buisson, fleur double, rose pâle
Prairie Youth	buisson, fleur semi double, rose pâle
Prairie Dawn	buisson, fleur double, rose

Les Clématites/ Trucs de culture par André Poliquin

- ACHAT** Choisir une plante dans un pot de **gros volume**. La hauteur de la plante importe peu. S'assurer d'un grand nombre de tiges saines et d'un bon tuteurage. Les racines doivent remplir le pot. Un plant d'au moins 2 ans constitue un achat plus sûr.
- PLANTATION** En **sol frais et bien drainé**, elle se fait durant toute l'année en orientation Sud ou Est pour de meilleurs résultats. Les cultivars zonés 4b-5 devraient faire face au sud. Les cultivars des Viticellas peuvent donner de bons résultats dans toutes les situations. Les sols trop argileux ou sablonneux doivent être amendés. L'arrosage abondant est nécessaire pour les jeunes plantes. Creuser un trou de forte dimension (3 fois le volume des racines) et **enterrer les premiers nœuds**, sans déranger les racines. Donner l'angle de plantation et tuteurer solidement. Donner **1 gallon d'eau par semaine** durant la première année. L'établissement d'une plante peut prendre 3 années.
- TUTEURAGE** **Le vent est le pire ennemi** des jeunes clématites. Ne pas enlever le tuteur original et rajouter des tuteurs solides pour permettre la lignification du premier mètre de tige. Choisir ensuite un support efficace et esthétique.
- PROTECTION** Pour les hybrides à grandes fleurs, les racines et le premier mètre de la plante doivent **être protégés de la chaleur** en été. Les plantes compagnes ne doivent pas endommager les racines des clématites. Les hybrides à grandes fleurs hâtifs nécessitent une protection de neige dans les zones 3 et 4. Cette protection doit protéger les bourgeons floraux contre les gels-dégels printaniers, mais ne doit pas réchauffer et déclencher l'ouverture des bourgeons de façon prématurée.
- ENGRAIS** Les clématites grimpantes sont des **plantes gourmandes**, à croissance rapide. Un apport d'engrais est nécessaire au printemps, suivi d'apports mensuels (30-10-10) jusqu'à leur floraison.
- MALADIES** Le flétrissement de la clématite attaque surtout les jeunes plants et les hybrides à grandes fleurs. Le champignon ***Ascochyta*** pénètre par une blessure de la tige. Les feuilles se déforment et noircissent du haut au bas du plant en 24 heures. Éliminer les tiges touchées et saupoudrer un antifongique systémique à la base du plant.
- TAILLE** Bien qu'il existe plusieurs types de tailles, selon les groupes de clématites, la taille au Québec ne se pratique que chez les plantes trop grosses ou qui présentent une hauteur de tronc ligneux trop importante. Elle se fait toujours **immédiatement après la période de floraison d'une clématite**, et consiste à éliminer ces parties fleuries. Elle est donc pratiquée au printemps, à l'été ou à l'automne, selon la plante. Toutefois, un nettoyage des parties mortes doit être effectué au printemps, après l'ouverture des bourgeons, sur toutes les clématites.
- CHOIX** Les espèces du genre ***Macropetala*** et ***Alpina*** sont rustiques, agressives et fleurissent tôt. Sont aussi rustiques les ***Orientalis***, ***Tangutica***, ***Tibetana***, ***Jouiniana***, ***Viticella***, ***Potanani***, ***Recta***, ***Fusca***, ***Flammula*** et ***Maximowicziana (Terniflora)***. Les **hybrides de *Viticella*** sont les plus faciles de culture; ils fleurissent sur les tiges de l'année et peuvent être rabattus fortement à l'automne. Les hybrides à grandes fleurs et les hybrides à fleurs doubles sont plus sensibles aux maladies, moins rustiques et plus exigeants.
- Plantes compagnes** L'accompagnement doit **protéger la base** des clématites **sans nuire à ses racines**. Les hostas constituent d'excellents choix puisqu'ils croissent dans les mêmes conditions.

COULEURS	CULTIVARS habituellement en vente en pépinière; mes choix préférés sont en caractères gras
<i>Clematis</i> blanches	<p>C. Huldine (<i>viticella</i>)3 C. Henry (hybride à grandes fleurs) 2 C. Mme LeCoultre (hybride à grandes fleurs)2-3 C. Marie Boisselot (hybride à grandes fleurs)2-3 C. Miss Bateman (hybride à grandes fleurs)2 C. Mrs George Jackman (hybride à grandes fleurs)2-3 C. Duchess of Edinburg (double, hybride à grandes fleurs)2 C. Guernesey Cream (hybride à grandes fleurs)2 C. Arctic Queen (double, hybride à grandes fleurs)2 <u>C. Maximowicziana, C. flammula, C. paniculata, C. jouniana, C. virginiana, C. alpina</u> <u>C. macropetala, C. recta</u> espèces)1</p>
<i>Clematis</i> Roses et lilas	<p>C. Hagley Hybrid (Pink chiffon) (<i>les deux; ie: H. grande fleur et Viticella</i>)2-3 C. Mme Baron Veillard (les deux)2-3 C. Comtesse de Bouchaud (les deux)2-3 C. Victoria (les deux)2-3 C. Richard Pennell (hybride à grandes fleurs)2-3 C. Proteus (hybride à grandes fleurs)2 C. Walter Pennell(hybride à grandes fleurs)2 <u>C. macropetala, C. alpina (Espèce)</u>1</p>
<i>Clematis</i> roses striées	<p>C. Bees' Jubilee (hybride à grandes fleurs)2 C. Dr Ruppel(hybride à grandes fleurs)2 C. Marcel Moser(hybride à grandes fleurs)2 C. Nellie Moser(hybride à grandes fleurs)2 C. Capitaine Thuilleaux(hybride à grandes fleurs)2 C. Sealand Gem(hybride à grandes fleurs)2-3</p>
<i>Clematis</i> Rouges	<p>C. Crimson King(les deux)2-3 C. Niobe(les deux)2-3 C. Ville de Lyon(<i>viticella</i>)3 C. Ernest Markham(les deux)2-3 C. Mme Edouard André(<i>viticella</i>)3 C. Cardinal Wyszynski(les deux)2-3 <u>C. alpina</u> (espèces)1</p>
<i>Clematis</i> Rouges striées	<p>C. Barbara Dibley(hybride à grandes fleurs)2-3</p>
<i>Clematis</i> Bleues	<p>C. Etoile violette (<i>viticella</i>)3 C. Général Sikorski(hybride à grandes fleurs)2-3 C. Lasurstern(hybride à grandes fleurs)2-3 C. Perle d'Azur(<i>viticella</i>)3 C. Will Goodwin(hybride à grandes fleurs)2-3 C. Elsa Spath(les deux)2-3 C. Ramona(hybride à grandes fleurs)2-3 C. The President(hybride à grandes fleurs)2-3 C. Lawsoniana(hybride à grandes fleurs)2-3 C. Vyvyan Pennell(hybride (à grandes fleurs double)2 <u>C. alpina, C. integrifolia, C. macropetala</u>(Espèce)1</p>
<i>Clematis</i> Mauves	<p>C. Lord Nevill(hybride à grandes fleurs)2 C. Jackmanii(<i>viticella</i>)3 C. Jackmanii superba(<i>viticella</i>)3 C. Gipsy Queen(les deux)2-3 C. Lady Betty Balfour(hybride à grandes fleurs)2-3</p>
<i>Clematis</i> Mauves striées	<p>C. Mrs. N. Thompson(hybride à grandes fleurs)2-3</p>
<i>Clematis</i> Jaunes (espèces)	<p><u>C. tangutica, C. tibetana, C. Orientalis</u> (espèce)1</p>

Groupes de taille:

- #1: Les espèces grimpantes ne nécessitent aucune taille. Si besoin est, tailler au-dessus d'un bourgeon viable après la floraison. Les espèces non grimpantes redémarrent à partir du sol au printemps.
- #2: Les hybrides à grandes fleurs très hâtifs peuvent au besoin être taillés immédiatement après leur floraison. Au Québec cependant, la taille ne devrait se faire que tard au printemps, au-dessus de bourgeons viables, pour enlever les parties mortes.
- #3: Ce groupe inclut les viticellas et les hybrides à grandes fleurs tardifs. Lorsque nécessaire, leur taille se pratique à l'automne, après la floraison, en-dessous des parties fleuries; elle risque d'éliminer des branches florifères. Au Québec, la taille devrait se faire tard au printemps dans le but d'éliminer seulement les parties mortes. Les viticellas endurent des tailles sévères puisqu'ils peuvent repousser à chaque année.
- NOTE La taille au Québec, en réalité, se limite au nettoyage des parties mortes, tard au printemps, après l'ouverture des bourgeons.